


## 【肺炎球菌ワクチン接種】

当院での、肺炎球菌感染症の予防接種は3種類のワクチンをご用意しております。

以下に、それぞれのワクチンについてまとめております。参考になさってください。

	ニューモバックス	プレベナー20	キャップバックス
ワクチンの種類	莢膜多糖体ワクチン	結合型ワクチン	結合型ワクチン
用法	1回筋肉内/皮下注射	1回筋肉内注射	1回筋肉内注射
血清型カバー率 (予防効果)	56.6%	55.6% 5年以上予防効果がある	80.3%
持続期間	概ね5年程度	生涯に1回接種でよいとされている	生涯に1回接種でよいとされている
副反応	接種部位の痛み、赤み、腫れ、熱感など  通常3~4日程度で治まる	接種部位の痛み、赤み、腫れ 筋肉痛、関節痛、頭痛など 通常2~3日程度で治まる	頭痛、筋肉痛、疲労、発熱 接種部位の痛み、赤み、腫れなど 通常2~3日程度で治まる
料金	6,600円	13,000円 (65歳の方: 5,900円)	15,000円

〈65歳以上の肺炎球菌ワクチン定期接種の考え方〉



### Q&A

Q. プレベナー20とキャップバックスはどちらを接種すれば良いのですか

A. それぞれのワクチンでカバーしている肺炎球菌の血清型が一部違うため、65歳の定期接種がまだな方はプレベナー20を接種し1年以上期間をあけていただくと、キャップバックスの接種も任意で可能となります。

Q. 以前に肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種したのですが、5年後にまた同じワクチン(ニューモバックス)を打った方が良いのですか

A. 現在、ニューモバックスの再接種は原則として選択されていません。(令和7年10月時点)  
肺炎球菌ワクチン接種をご希望の場合、プレベナー20またはキャップバックスの任意接種が可能となっております。